



لماذا يتحتم على إجراء الاختبار؟

يساعد إجراء المزيد من الاختبارات في الكشف المبكر عن الإصابات، والتي بدونها ما كانت لتُكتشف لذلك يمكن إيقاف موجات العدوى، من خلال الحجر الصحي المنزلي المبكر. هكذا يمكن الحد من انتشار الفيروس. احم نفسك والآخرين!

أين يمكنني إجراء الاختبار؟

متاح للمواطنين إجراء ما يسمى باختبار المواطن، وهو اختبار سريع مجاناً مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. لذلك يمكنهم استخدام مراكز ومحطات الاختبار المخصصة من الولايات والبلديات. هناك آلاف الأماكن لإجراء الاختبارات على مستوى ولاية نوردرهاين-فيستفالن. يمكنك إيجاد إمكانية إجراء الاختبار في منطقتك من خلال www.testen.nrw.

كم مرة يجب علي إجراء الاختبار؟

مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إنك بهذا تساهم بشكل فعال في احتواء فيروس كورونا.

ماذا أفعل في حالة نتيجة الاختبار إيجابية؟

تشير نتيجة الاختبار الإيجابية إلى الاشتباه في وجود إصابة بفيروس كورونا SARS-CoV-2، ويجب على الفور التأكد منها من خلال إجراء ما يسمى بتحليل PCR-Test. يرجى الاتصال بطبيب أو طبيبة مكتب الصحة أو مركز الفحص. إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية على الفور، حيث إنك شديد العدوى للآخرين. ويتحتم عليك الدخول في العزل المنزلي بعد ذلك مباشرة، وتجنب الاتصال بالآخرين. فقط عندما لا يؤكد تحليل PCR-Test التالي الإصابة، لن تعد بحاجة للحجر المنزلي.

ما الإجراءات المتبعة للاختبار؟

تستخدم حالياً إجراءات الاختبار التالية للكشف عن فيروس كورونا SARS-CoV-2:

1. إجراء ما يسمى بتحليل PCR-Test بواسطة العاملين في المجال الطبي والتأكد منه في معمل طبي. وهو يدل على المادة الجينية للفيروس.
2. إجراء تحليل الأجسام المضادة (السريع) Antigen-(Schnell-) Test لفيروس كورونا SARS-CoV-2 يتم بواسطة موظفين مدربين. يتم إجراؤه من خلال موظفين مدربين.
3. التحليل الذاتي Der Selbsttest شبيه بتحليل الأجسام المضادة السريع، حيث يتفاعل مع بروتين جزء معين من الفيروس..

تحليل PCR-Tests هو من أوثق تحاليل فيروس كورونا على الإطلاق. يأخذ الطاقم الطبي فيه مسحة من الأنف أو الحلق على سبيل المثال. يتم تقييم تحليل PCR-Tests من خلال المختبر. تظهر نتيجة التحليل بعد أربع إلى ست ساعات على الأقل. قد يستغرق الوقت بين سحب العينات والإبلاغ عن النتائج بضعة أيام، وذلك يتوقف على عدد العينات.

إجراء تحليل الأجسام المضادة (السريع) Antigen-(Schnell-)Test لفيروس كورونا SARS-CoV-2 يتم بواسطة موظفين مدربين. يتم فيه سحب مسحة من الأنف أو الحلق، كما هو الحال مع تحليل PCR وعادة ما تظهر فيه نتيجة التحليل على الفور مباشرة بشكل أسرع، بعد 15 دقيقة بحد أقصى. غير أنها ليست موثوقة كتحليل PCR-Test فهي تصف حالة لحظية فقط. إذا كانت نتيجة الاختبار السريع إيجابية، يجب فوراً إجراء اختبار PCR لمزيد من التأكيد.

ومنذ مطلع مارس يتوافر التحليل الذاتي Selbsttests في المتاجر يمكن لأي شخص إجراؤه بصفة عامة وهو يعمل كتحليل Antigen-Schnelltests الأجسام المضادة (السريع). وفيها يتم سحب العينات وتحليلها بسهولة وسرعة. إلا أن موثوقيتها تعتمد على أخذ العينات وإجراء التحليل بشكل صحيح في الوقت المناسب، وعموماً فهي تعد أقل موثوقية من تحاليل PCR في حالة أن التحليل الذاتي يشير إلى وجود اشتباه في إصابة، يستلزم ضرورة التأكيد عن طريق تحليل

PCR