

Aktuelne informacije o vakcinaciji protiv korona virusa u Severnoj Rajni-Vestfaliji

Gde mogu da se vakcinišem?

Od 1. oktobra 2021. vakcinaciju protiv korona virusa u Severnoj Rajni-Vestfaliji uglavnom preuzimaju domaći lekari i lekari kompanija. Prva kontakt osoba ako ste zainteresovani za vakcinaciju je obično vaš izabrani lekar. Ako nemate kućnog lekara, [ovde](#) ćete naći ordinacije za vakcinaciju u Severnoj Rajni i [ovde](#) ordinacije za vakcinaciju u Vestfaliji-Lipe kojima se možete obratiti.

Pored toga, 53 okruga i vanokružnih gradova su uspostavila mrežu decentralizovanih mesta za: [Ponude za vakcinaciju u Severnoj Rajni-Vestfaliji](#).

Pored toga, širom zemlje postoje ponude za mobilnu vakcinaciju sa niskom granicom ili kampanje vakcinacije.

Zašto je dodatna vakcinacija (buster vakcinacija) važna?

Oni koji se vakcinišu protiv Kovida-19 štite sebe i ljude oko sebe i pomažu u usporavanju širenja virusa. Dostupne vakcine protiv Kovida-19 štite posebno od ozbiljnih bolesti. Čak i ako se infekcije koronom ne mogu u potpunosti sprečiti vakcinacijom, ljudi koji se zaraze uprkos vakcinaciji u manjoj meri doprinose širenju virusa i na taj način smanjuju rizik od infekcije za druge.

Ipak, trenutne studije pokazuju da zaštita vakcinacijom od infekcije vremenom slabi, posebno kod veoma starih ili kod ljudi koji imaju oslabljen imuni sistem. Kod starijih ljudi takođe je slučaj da je reakcija imuniteta generalno niža nakon vakcinacije. Dodatna vakcinacija može značajno povećati zaštitu vakcinisanjem, npr., u obliku ponovnog značajnog povećanja broja antitela. Dodatna vakcinacija deluje kao pojačavanje (engleski: booster) imunološkog sistema – zbog toga je poznata i kao buster vakcinacija.

Kada se preporučuje dodatna vakcinacija?

Stalna komisija za vakcinaciju (STIKO) trenutno preporučuje dodatnu vakcinaciju **u razmaku od tri meseca** od poslednje doze vakcinacije osnovne imunizacije. Od ovog pravila su izuzete odluke u posebnim slučajevima, kada postoji medicinska indikacija za raniju dodatnu vakcinaciju, ukoliko postoji minimalno vremensko rastojanje od četiri nedelje. Međutim, takav minimalni interval od četiri nedelje eksplicitno ne predstavlja preporuku, već apsolutnu donju granicu za pojedinačne odluke. Ovaj interval vakcinacije zasniva se na trenutnoj preporuci Stalne komisije za vakcinaciju (STIKO) o vakcinaciji protiv KOVID-19, prema kojoj se, na primer, dodatna vakcinacija imunodeficientnih osoba sa očekivanom znatno smanjenom reakcijom na vakcinu za optimizaciju serije vakcina može primeniti četiri nedelje nakon druge doze vakcine.

Da li mi treba još jedna doza za pojačavanje ako sam već vakcinisan vakcinacijom mRNA nakon vakcinacije Johnson&Johnson?

Stalna komisija za vakcinaciju (STIKO) generalno preporučuje treću vakcinaciju u slučaju serije vakcinacija sa vakcinom Johnson&Johnson. Četiri nedelje nakon prve doze vektorske vakcine Johnson&Johnson, preporučuje se druga vakcinacija mRNA vakcinom. Do sada je druga vakcinacija bila dovoljna da se prepozna kao buster. Prema trenutnom stanju istraživanjima, sada su potrebne i tri doze za status buster kod osoba vakcinisanih sa Johnson&Johnson: Tri meseca nakon druge vakcinacije potrebna je redovna dodatna vakcinacija sa drugom mRNA vakcinom.

Ko može dobiti dodatnu vakcinaciju?

Stalna komisija za vakcinaciju (STIKO) preporučuje dodatnu vakcinaciju mRNA vakcinom (obično tri meseca nakon druge vakcinacije) za sve osobe starije od 12 godina.

Posebne grupe ljudi bi, međutim, trebalo da dobiju dodatnu vakcinaciju kao prioritet. Ovo uključuje osobe sa imunodeficijencijom, osobe starije od 70 godina i više, stanovnike i negovatelje u ustanovama za negu starijih osoba i osoblje u medicinskim i ustanovama za negu sa direktnim kontaktom sa ugroženim osobama. Ljudi koji do sada nisu primili vakcinu protiv korone treba prioritetno da dobiju osnovnu imunizaciju.

Koje vakcine se koriste za dodatnu vakcinaciju?

Samo mRNA vakcine (Biontech, Moderna) se koriste za dodatnu vakcinaciju. Samo ove dve vakcine su trenutno odobrene za dodatnu vakcinaciju u Nemačkoj. Ako je osnovna vakcinacija izvršena vakcinom mRNA, ista vakcina treba koristiti za dodatnu vakcinaciju. Ako ona nije dostupna, može koristiti i druga. Upotreba BioNTech se generalno preporučuje za osobe mlađe od 30 godina. Ovo se odnosi na osnovnu i dodatnu vakcinaciju.

Gde mogu dobiti dodatnu vakcinaciju?

Dodatne vakcinacije vrše, između ostalog, mobilni timovi za vakcinaciju, lokalni lekari, lekari kompanija ili centri za vakcinaciju, i u okviru mobilnih ponuda za vakcinaciju. Ovo je pregled mesta vakcinacije u Severnoj Rajni-Vestfaliji: [Ponude za vakcinaciju u Severnoj Rajni-Vestfaliji](#).

Vakcinisan sam sa AstraZeneca ili Johnson&Johnson. Mogu li i pored toga da dobijem dodatnu vakcinaciju?

Za one koji su primili prvu zaštitnu vakcinaciju vektorskom vakcinom Johnson&Johnson, za optimizaciju zaštite, STIKO preporučuje dodatnu vakcinaciju mRNA vakcinom od četvrte nedelje nakon vakcinacije Johnson&Johnson i dodatnu vakcinaciju 3 meseca kasnije. Ove osobe se tek sa trećom vakcinacijom smatraju buster vakcinisane.

Osobe koje su prvo primile seriju vektorske AstraZeneca vakcine takođe mogu dobiti dodatnu vakcinaciju mRNA vakcinom tri meseca nakon druge vakcinacije. Isto važi i za ljude koji su unakrsno vakcinisani (1. vakcinacija: vektor vakcina + 2. vakcinacija: mRNA vakcina).

Da li je dodatna vakcinacija besplatna?

Da. Sve vakcinacije protiv korona virusa su besplatne. To takođe važi za dodatnu vakcinaciju.

Dobio sam i vakcinu protiv gripa. Da li se ovo toleriše sa dodatnom vakcinacijom?

Da. Vakcinacija protiv gripa se može izvršiti zajedno sa vakcinacijom protiv korona virusa.